

THÔNG TIN THUỐC

Số: 02/2022TTT-KD

Khoa Dược xin thông tin đến các khoa, phòng một số thông tin cập nhật như sau:

PANCRES



Thành phần:

Pancreatin 170 mg (tương đương với 238 IU Protease, 4.080 IU Amylase, 3.400 IU Lipase).

Chỉ định:

- Điều trị các chứng kém hấp thu do thiếu các men tiêu

hóa trong pancretin như: Ăn không tiêu, biếng ăn, chướng bụng, đầy hơi.

Liều dùng - Cách dùng:

- Dùng trong bữa ăn, nuốt nguyên viên, không nghiền nát vì có thể kích ứng niêm mạc miệng.

- Người lớn: Liều được điều chỉnh theo nhu cầu bệnh nhân, thông thường mỗi lần 2 viên, 2-3 lần/ngày.

*** Độ an toàn và hiệu quả của thuốc dùng cho trẻ em chưa được chứng minh nên không dùng cho trẻ em.**

Tương tác với thuốc khác:

- Pancreatin dùng đồng thời với acid folic bằng đường uống giảm hấp thu với acid folic.

- Với các antacid và thuốc kháng histamine H₂: Làm giảm sự khử hoạt tính của enzyme.



P PHÒNG KHTH

Thư ký

KHOA DƯỢC

Thư ký

DS. Trần Hải Châu

BS. CKI. Nguyễn Thị Xuân Chúc